

Tabel 1. Medicinrådets lægemiddelrekommandation for lægemidler til forebyggende behandling af arveligt angioødem

Prioriteret rækkefølge af lægemidlerne	Handelsnavn (lægemiddel)	Dosering og dispenseringsform	Bemærkninger
Anvend som 1. valg til mindst 80 % af patienterne*	Takhzyro (Abacus) (lanadelumab)	300 mg s.c. hver 2.-4. uge	Det kan overvejes at reducere dosis ved at forlænge dosisintervallet fra 2 til 4 uger hos patienter, som er stabile og uden anfald i 3 måneder. Dette har i klinisk praksis vist sig muligt hos godt halvdelen af patienterne.
Anvend som 2. valg	Berinert 2000 IE og 3000 IE1 (C1-inhibitor)	60 IE/kg legemsvægt s.c. 2 gange ugentligt	
Overvej	Orladeyo (berotralstat)	Oralt 150 mg én gang dagligt	Overvej, hvor det ikke er muligt at anvende forebyggende subkutan behandling, eller denne må ophøre pga. bivirkninger.
Anvend kun i særlige tilfælde	Cinryze (C1-inhibitor)	I.v. Individuelt	Anvend kun, hvor det ikke er muligt at anvende et subkutan eller oralt administreret lægemiddel

*Procentsatsen beskriver den andel af populationen, der som minimum bør begynde behandling med 1. valget.